

Recherches sur l'origine et le siége des fausses eaux, de même que sur la nécessité des eaux de l'amnios pour la formation des certains organes et la nutrition du fœtus.

De tout tems les Savans se sont appliqués à pousser leurs connoissances aussi loin qu'il fut possible dans les recherches des objets de leur méditation ou de leur profession. S'ils n'ont par toujours réussi à approfondir leur sujet, ils ont du moins fait naître des idées plus claires, plus distinctes et plus vraisemblables aux imitateurs de leur noble emulation. Animé du même zèle j'ai fait des reflexions sur l'origine et le siége des fausses eaux ainsi que sur l'usage des eaux de l'amnios. j'ai été conduit à cette entreprise par l'exposition du savant M. Levet dans son traité des accouchemens.

Avant d'entrer dans le détail de l'objet que je me propose de discuter, je ne saurois me dispenser de parler de l'origine des eaux de l'amnios. Mauriceau après avoir parlé de l'incertitude touchant la source de ces eaux, et avoir rapporté les opinions de differens auteurs, dit: que ces eaux proviennent de la transpiration du corps de l'enfant, laquelle ne pouvant traverser les membranes se condense et forme les eaux en question; mais il ne fait pas attention que cette excretion ne peut être aussi considerable dans le fœtus pendant son accroissement, non plus que celle des urines que d'autres admettent comme source des eaux de l'amnios. Je pense que ces excretions ne peuvent se faire sans la respiration, et que dans le fœtus il ne s'en fait qu'autant qu'il faut pour former et préparer les organes, qui doivent y servir après la naissance, comme je le dirai plus amplement à la fin de ce memoire.

La source la plus vraisemblable
celle qui est indiquée par le *Savant* *Médecin*
des accouchemens troisième édition par
l'auteur dit " que la partie purement a
eaux de l'amnios, vient des parois de la cavité de la matrice et qu
et que la partie qui la colore et qui l'ép
excretions cutanées de l'enfant, et des

Il poursuit §. 317. qu'il est possible
ces eaux est fournie par le moyen de
entourent l'enfant, et qui sont parsemées
quantité de vaisseaux lymphatiques

Il admet au §. 318. comme se
eaux les vaisseaux capillaires dont l'embryon
hérissé après la séparation de la matrice
existent déjà dans l'oeuf, lequel états
y contracte dans toute sa circonférence
adhérence aussi forte qu'à l'endroit où
ces vaisseaux capillaires finissent à la
à de petites glandes qui suintent con
de la même manière que se fait la sé
du péricarde.

L'adhérence du chorion est si b
que lorsqu'après un accouchement le
casse, que le placenta ne se détachant
l'on est obligé de le dégager par le se
détache le placenta, mais le chorion
souvent des lambeaux attachés au
Je suis sur de ce fait par mes propres

blés le commencement de la grossesse ne
ont point à la face interne de la matrice et
par libre, les porosités de la matrice qui répondent
à l'horion, fournissant autant de serosité
attachées, cette serosité s'amasse à proportion
de jour en jour plus considérable par
us et du chorion.

Les eaux de l'amnios, étant, dans le com-
mencement dans le progrès de la grossesse, égale-
ment ne sauroit expulser ces eaux qui se
sont des membranes; ce n'est que dans le tems
de l'enfer fort pour remuer ses membres
même lorsqu'il a fait la culbute
appui solide du sommet de la tête contre
et lut donner des coups de coude, de pied
et fort qu'auparavant, et les donnant
à ces membranes font en dedans il force
à creuser un chemin entre le chorion et la
placenta et relâchent au point à leur
à la. C'est pour cette raison que l'écoule-
ment arrive ordinairement dans le dernier

et n'étant point mêlée avec la transpiration
et ne faisant point de feces à cause de
celle est exempte de couleur, d'odeur et
ne teint point le linge blanc et propre
à l'usage.

On ne s'aperçoit que les accoucheurs doivent con-
venir qu'elles seroient dans le tems que la
sagesse, et qui devoient les avertir de ne
pas au travail; ils pourroient se convaincre
et toucher ils s'apercevoient que les membranes

Voilà l'idée que j'ai de la source, du siege et de l'écoulement des fausses eaux; je suis porté à croire qu'il ne s'en forme que dans les femmes qui sont d'une complexion pituiteuse, qui sont mal réglées, ou qui sont sujettes aux pertes de sang. Je n'entre point dans le détail des erreurs où les sages-femmes et même des accoucheurs sont induits par l'apparition et l'écoulement de ces eaux. J'ai traité l'année dernière la femme d'un officier du Roi, que la sage-femme trompée par l'écoulement de ces eaux a ^{voit} force d'accoucher dans le huitième mois de sa grossesse, accouchement qui a été précédé pendant six semaines d'un écoulement par intervalle de ces eaux et qui a été suivi d'une perte de sang, laquelle fut apparemment causée par les efforts violens que la femme fit pour accoucher ou même par un tiraillement excessif au cordon ombilical pour détacher le placenta.

La cause qu'il se trouve des intervalles dans l'écoulement de ces eaux, c'est qu'il faut qu'elles se soyent amassées, que par leur quantité et leur gravité, y joint le mouvement de l'enfant, elles puissent se frayer une route, abbreuver et déterminer l'orifice interne à s'ouvrir et donner passage à ces eaux; mais aussitôt qu'elles sont sorties, le museau de la matrice se ferme et reste ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle quantité d'eau l'oblige à se rouvrir, par le concours des dites causes.

Les usages qu'on donne avec raison aux eaux contenues dans l'amnios sont 1^o. de servir en quelque sorte de nourriture à l'enfant, depuis le commencement jusqu'à la fin de la grossesse 2^o. de modérer dans les premiers mois

les effets des secousses que l'embryon pourroit recevoir S.
sans elle des mouvemens de la femme (j'y ajoute que
cet usage a lieu tout le tems de la grossesse) 3^o d'éviter
les pressions des corps environnans 4^o d'empêcher par la
suite que les mouvemens de l'enfant ne soient trop
douloureux à la mere; 5^o de concourir à la dilatation de
l'orifice de la matrice dans le tems du travail de l'accouchement.

Voilà cinq usages bien fondés, j'ose y ajouter un
sixieme auquel on n'a pas fait attention jusqu'ici et qui
pas moins doit être regardé comme le principal parcequ'il
sert au développement du fœtus et à la formation de certains
organes: avant de procéder à la demonstration de ce que
j'avance, il est nécessaire que je dise quelque chose (mots)
du développement de la matière qui sert à la formation
du fœtus.

Tous les physiciens sont d'accord qu'il n'y a pas de plus
profond mystere dans la nature que celui de la génération
de l'homme, quoiqu'il n'y ait rien de plus connu que l'acte
dont elle est l'effet immédiat. Pour nous en convaincre
nous n'avons qu'à examiner l'idée que les anciens naturalistes,
même ceux qui ont vécu sur la fin du dernier siècle avoient
de la conception: ils admettoient la procréation de l'homme
par le concours des semences de deux sexes dans un lieu
convenable, idée assez assez vaine pour tatonner dans les ténèbres.

Depuis que Bartholin a découvert les ovaires dans la femme
on a établi le système que l'homme fut le produit d'un œuf
fécondé et séparé de l'ovaire et on a divisé les especes en ovipares
et vivipares, l'homme et les quadrupèdes sont de cette dernière
classe: mais il s'agissoit d'approfondir de quelle maniere
l'œuf fut fécondé et que par quelle cause efficiente il en fut

8.
produit un animal. Les uns prétendoient que l'oeuf recevoit la fécondité de la semence prolifique de l'homme comme par une rosée (per irrorationem), par conséquent ils logeoient la matière principe de l'homme dans l'oeuf de la femme. Les autres s'imaginoient avoir apperçu par le moyen des microscopes dans la semence de l'homme des animalcules dont ils prétendoient qu'un entroit en l'acte de la copulation dans l'oeuf, qui ne servoit que de matrice à l'animalcule, ils donnoient par conséquent tout l'honneur à l'homme.

C'est ici où l'intelligence humaine trouve des bornes et jusqu'à ce que nous puissions nous tirer de ce labyrinthe nous sommes obligés de nous en tenir à ce que nos sens peuvent nous découvrir, néanmoins la raison nous guide à croire que les rudimens de toute les parties de notre individu se trouvent dans la première matière dont l'homme est formé, je veux dire dans l'oeuf que la semence de l'homme, comme cause efficiente, vivifie qu'il faut de la chaleur pour la développer, et que la différence des parties dépend de la disposition de la matière. C'est donc en vain que les Anatomistes veulent s'efforcer à prouver et à démontrer, que le cerveau est une production des dernières ramifications des artères qui montent dans la cavité du crâne, que les ongles sont formés par l'épiderme &c. &c.

Tout de même qu'il se trouve dans un oeuf de poule les rudimens qui doivent former les plumes, le bec, la peau, les argots, la chair, les os, les cartilages, les ligamens &c. &c. tout de même se trouve aussi dans la première matière dont l'homme est formé un principe pour chaque partie de son individu, de manière que la principe prolifique et la chaleur n'en peuvent produire autre chose, que ce que la matière est disposée de former.

Je n'entre point dans l'histoire du développement de l'Embryon depuis le moment de la conception jusqu'à la naissance de l'homme; je ne ferois qu'une répétition inutile de tout ce que les auteurs ont dit jusqu'à présent à ce sujet je tâcherai seulement de démontrer combien les eaux de l'amnios sont nécessaires pour la formation de certains organes et combien il est certain qu'elles servent à la nutrition du fœtus.

Aussitôt que l'œuf fécondé est reçu dans la matrice son orifice interne se ferme exactement, ses parois se gonflent et diminuent son vuide; mais l'œuf venant à acquies^{er} du volume les parois uterines cedent à son extension impulsive et fournissant au travers des membranes du fluide, elles augmentent la quantité de celui contenu dans l'œuf, laquelle quoique très petite agit de son centre à la circonférence.

La résistance ou plutôt la réaction de la matrice sur le produit de la conception oblige la liqueur y contenue à entrer dans les parties de l'animal dans lesquelles, selon la disposition de la matière il doit se trouver de la vacuité. Ce que je viens de dire doit s'entendre de ces parties, qui après la naissance doivent recevoir quelque matière destinée à un usage particulier; car il y a des organes dont la vacuité, ou pour mieux dire, l'espace intérieur est produit et formé par la liqueur émanante d'un autre organe, avec lequel ils ont connexion et qu'ils en dependent même.

Tel est le cœur qui dans la particule de la matière principe contient une liqueur qu'il presse vers l'origine de la matière qui doit former les tuyaux arteriels, lesquels en poussant la liqueur, qui leur a été envoyée du cœur, vers l'origine de la matière qui doit faire les tuyaux veneux, forme ainsi le chemin creux dans lequel doit se faire la circulation du sang.

Il n'en est pas de même des autres organes qui par des ouvertures spacieuses à la superficie de l'animal communiquent au dehors. Tels sont l'organe de la respiration et celui de la digestion. Quant aux organes de l'ouïe et de l'odorat elle y entre pour fort peu pas moins elle y est nécessaire.

La liqueur de l'amnios par la réaction de la matrice est forcée d'entrer dans toutes les cavités dont les orifices répondent à la superficie du corps. Par conséquent elle entre par les narines, emplit les cavités olfactoires et sert pour ainsi dire, à borner par sa pression la matière dont se doit former les cornets, à les maintenir dans leur juste position et à empêcher qu'ils ne se portent trop d'un côté ou de l'autre.

La même liqueur ayant empli tant les narines que la bouche entre par la même action dans la trachée artère et sert, pour ainsi dire, de moule sur laquelle se forme le Larinx, la trachée artère et les bronches. Laquelle moule liquide augmente de volume et occupe l'espace qui forment successivement les cartilages dont le larinx, la trachée artère et les bronches sont composés.

Et après l'organe de la respiration parlons de celui de l'ouïe et examinons si les eaux contenues dans l'amnios peuvent également contribuer quelque chose à sa formation. Ces eaux, par la pression dont, j'ai souvent parlé, entrent dans le meat auditore et heurtent contre la matière qui doit former la membrane du tambour, or, si cette pression ne se fit que du dehors vers l'intérieur, et qu'il n'y eût ici rien qui fit résistance, il paroît évident que cette membrane devoit être pressée en dedans et même crever avant la naissance de l'enfant: mais comme cela n'arrive point il est manifeste, qu'il entre des eaux de l'amnios par les trompes d'Eustache, (il paroît même que

c'est leur principal usage avant la naissance) et soutenues 9.
par le reste du volume de ces eaux elles tiennent les dites
trompes ouvertes, les dilatent à mesure que le foetus grandit
et font intérieurement à la membrane du tambour une
pression égale à celle que font ces mêmes eaux extérieu-
rement, par ce moyen la dite membrane est maintenue
dans une juste position et extension.

C'est selon moi dans la formation des organes de la
digestion et de la chylicification que ces eaux jouent le plus
grand rôle, partant des principes du mécanisme elles y con-
tribuent de la manière suivante.

Ces eaux suivant les loix de statique entrent dans le
vide qu'elles trouvent dans l'embryon, les cavités se protègent
successivement au volume de ces eaux et suivant l'étendue
qu'elles doivent avoir à proportion de l'âge du foetus, ainsi
c'est sur ces eaux que se moulent le pharynx, l'œsophage, le
ventricule, les intestins; la différence du volume, de la grosseur
et de la substance de ces parties dépendent (derivent) de la
disposition et de la quantité de la matière dont elles se forment
et de même que pour la fabrique d'une bouteille de pinte
il faut plus de matière vitreuse qu'il n'en faut pour une
phiole de quatre onces ou un cylindre de deux pieds, de même
aussi faut-il plus de matière principe pour la formation
du ventricule et des gros boyaux, qu'il n'en faut pour les
intestins grêles. Comme dans la fabrique des verreries c'est
la quantité d'air qui détermine la grosseur des corps, c'est
dans le foetus celle des eaux de l'amnios qui font l'étendue
des parties susdites proportionnellement à la quantité et à la
disposition de la matière y destinée.

Ces mêmes eaux par la pression qu'elles reçoivent de
toute leur circonférence et par la résistance des intestins

Il n'en est pas de même des autres organes qui par des ouvertures spacieuses à la superficie de l'animal communiquent au dehors. Tels sont l'organe de la respiration et celui de la digestion. Quant aux organes de l'ouïe et de l'odorat elle y entre pour fort peu pas moins elle y est nécessaire.

La liqueur de l'amnios par la reaction de la matrice est forcée d'entrer dans toutes les cavités dont les orifices répondent à la superficie du corps. Par conséquent elle entre par les narines, emplit les cavités olfactoires et sert pour ainsi dire, à borner par sa pression la matiere dont se doit former les cornets, à les maintenir dans leur juste position et à empêcher qu'ils ne se portent trop d'un côté ou de l'autre.

La même liqueur ayant rempli tant les narines que la bouche entre par la même action dans la trachée artère et sert, pour ainsi dire, de moule sur laquelle se forme le Larinx, la trachée artère et les bronches. Laquelle moule liquide augmente de volume et occupe l'espace que forment successivement les cartilages dont le larinx, la trachée artère et les bronches sont composés.

Après l'organe de la respiration parlons de celui de l'ouïe et examinons si les eaux contenues dans l'amnios peuvent également contribuer quelque chose à sa formation. Ces eaux, par la pression dont j'ai souvent parlé, entrent dans le meat auditore et heurtent contre la matiere qui doit former la membrane du tambour, or si cette pression ne se fit que du dehors vers l'intérieur, et qu'il n'y eût ici rien qui fit résistance, il paroit évident que cette membrane devoit être pressée en dedans et même crever avant la naissance de l'enfant: mais comme cela n'arrive point il est manifeste, qu'il entre des eaux de l'amnios par les trompes d'Eustache, si paroit même qu'il

c'est leur principal usage avant la naissance / et continuës 9.
par le vu du volume de ces eaux elles tiennent les dits
trompes ouvertes les dilatent à mesure que le fœtus grandit
et font intérieurement à la membrane du tambour une
pression égale à celle que font ces mêmes eaux extérieu-
rement par ce moyen la dite membrane est maintenue
dans une juste position et extension.

C'est donc moi dans la formation des organes de la
digestion et de la circulation que ces eaux jouent le plus
grand rôle partant des principes du mécanisme que y con-
tribuent de la manière suivante

Les eaux étant les trois éléments se trouvent dans le
ventre qu'elles trouvent dans l'embryon, et ces eaux se portent
proportionnellement au volume de ces eaux et suivant l'élément
qu'elles doivent avoir à proportion de l'âge du fœtus, ainsi
c'est un ces eaux que se mouvent le pharynx, l'œsophage, le
ventricule les intestins la distance du fœtus à l'embryon
et la substance de ces parties se peuplent et dérivent de la
disposition et de la quantité de la matière ont elles été formées
et le même qui pour la formation d'une bête se peuplent
il faut plus de matière vitale que il n'en faut pour une
phiole de quatre onces ou un cylindre de deux pieds de haut
suffisant il plus de matière principe pour la formation
du ventricule et les gros boyaux qu'il n'en faut pour les
intestins grêles. Comme dans la fabrication des verreries c'est
la quantité d'air qui détermine la grosseur des corps c'est
dans le fœtus même ces eaux de l'amnios qui sont étendues
les parties sus dites proportionnellement à la quantité et à la
disposition de la matière destinée.

Les mêmes eaux par le moyen qu'elles reçoivent de
toute leur circonférence et par la résistance des intestins

16. sont forcées à entrer dans les orifices naissans des veines
lactées de creuser et de développer la matière qui les fait former.
L'entrée de ces eaux dans le fœtus se fait par pression
et elles y parcourent successivement le chemin par les glandes
du mésentère jusqu'au réservoir de Péquib; y étant pénétrées
elles s'échappent suivant le volume qu'il doit avoir par la
quantité et la disposition de la matière. ce moyen de la pression
vainc la résistance du paroi du réservoir et l'espace étroit
entre les corps des vertèbres et les piliers du diaphragme elles
debouchent le canal thorachique et à l'aide des valvules et
du battement des artères intercostales elles montent jusqu'
dans la veine sous-clavière gauche où elles se mêlent avec le sang.

Il est évident par tout ce que je viens d'exposer que
ces eaux en servant au développement et à la formation
des organes de la digestion et de la chylification, par une
conséquence nécessaire et qu'on peut même dire absolue, en
servent en même tems à la nutrition du fœtus, et aussi
il est possible qu'un fœtus puisse être nourri et croître
par ces eaux seule sans le secours du cordon ombilical
autant plus que les matières nutritives qui passent par
ces deux voyes différentes au long et sont tirées d'une
même source, et qu'il ne s'agit que d'une plus grande
affluence de ces eaux de l'omphalos lorsque l'autre voye manque.

Quoique rare et surprenant et peut-être impossible
qu'on ait trouvé des enfans parvenus à terme sans cordon
ombilical, cette voye peut manquer sans préjudice à
l'individu mais l'autre par une conséquence physique
absolue ne le doit jamais.

Cette intrusion de ces eaux est bien prouvée par
la trouée des enfans et même des quadrupèdes dont les eaux

de l'amnios gelées faisoient un corps continu dans la bouche, le pharynx, l'estomac et le canal intestinal.

Ces eaux subissent même dans les premières voyes une préparation qui les rend plus propres à la nutrition du fœtus, car elles entrent dans le ventricule en une certaine coction cet organe commençant déjà à exercer les fonctions qu'il doit parfaire dans l'homme né; par cette coction la matière la plus grossière se sépare et s'attache aux parois de ce viscère à peu près comme la partie terreuse reste attachée aux parois d'un Cognac dans lequel on fait souvent bouillir de l'eau. Ce sont les glaires que les enfans rendent ordinairement par le haut dans les premiers jours de leur naissance.

De plus ces eaux acquièrent une affinité avec le sang dans le trajet qu'elles ont à faire, par le mélange qui se fait dans la bouche avec la salive ou plutôt l'excrétion des glandes parotides, maxillaires, linguales, amygdalales &c. dans l'œsophage avec le produit de l'excrétion des glandes œsophagiennes, dans l'estomac avec le suc gastrique &c.

Cette préparation parvient à sa perfection dans le duodenum par le mélange qui s'y fait avec la bile et le suc pancréatique, ces eaux y étant mêlées avec la bile produisent un liquide laiteux, dont la partie la plus fluide est recueillie par les veines lactées, et la matière la plus grossière est poussée par un mouvement de protrusion des intestins grêles jusqu'à dans le colon, je veux dire par le mouvement vermiculaire des intestins, qui supplée au défaut du mouvement peristaltique.

Le colon étant fort gros et formant comme par brides des sacs continus, il suffit pour loger tout le marc ou résidu du fluide digéré durant le tems que l'enfant est contenu dans la matrice. Ce résidu acquiert par son séjour plus de consistance qu'il n'avoit quand il est entré dans ce boyau.

et la couleur verdâtre lui vient de la mixtion avec la bile. Quelques veines lactées qui se trouvent dans le mesocolon resorbent la fluidité qui pourroit être rentée dans ce résidu ou meconium et le sphincter du rectum n'étant point forcé par le diaphragme ferme la sortie au meconium, et il n'en peut s'échapper que par le forcément, comme nous le remarquons dans la mauvaise position des enfans et dans les accouchemens laborieux.

J'ai dit à la page. 7. §. . . 4. que le coeur dès qu'il commence à se mouvoir envoyoit son fluide dans la matiere qui doit former le système artériel et veineux et préparoit ainsi la voye de la circulation du sang. ce même mécanisme doit s'entendre aussi des artères qui en finissant dans les glandes conglomérées y débouchent les canaux sécrétoires et excrétoires. Le sang veineux qui est porté par les veines spléniques et mésentériques dans le foye y débouche les conduits hépatiques et développe par l'amas de la bile la vésicule du fiel, et celui-ci crause successivement un conduit par lequel il se décharge dans le duodenum. Il en est de même dans les reins, les urethères, la vessie urinaire &c. C'est les urethères qui distillent successivement une quantité d'urine sur laquelle se moule la vessie urinaire et prend l'étendue qu'elle doit avoir, le fœtus ne rend pas d'urine, le sphincter ferme exactement la vessie et il ne peut être forcé que par l'action du diaphragme. Le canal de l'urethre se forme sur les eaux de l'amnios et l'amas de l'humour glaireux des glandes dont les canaux excrétoires aboutissent dans ce canal.

Les arterioles sanguifères qui serpentent dans les tegumens communs du corps en se divisant en mille et mille ramifications finissent à la surface de la peau par une infinité de petites ouvertures auxquelles les anatomistes ont donné le nom de pores exhalans; c'est par ces pores que se fait la transpiration. Les glandes sébacées en recevant

de dernières arterioles la matiere pour preparer l'humour 13.
sebacée, en font l'excretion; cette humeur s'attache à l'épiderme
et conjointement avec l'humour de la transpiration forment
la crasse qu'on trouve sur le corps des enfans nouveaux nés
et troublent les eaux de l'amnios, c'est à dire, les rend presque
opaques, c'est par là qu'elles se distinguent de fausses eaux.

Mais outre ces pores exhalans, que j'ai dit se trouver
à la surface de la peau, il y en d'autres, qui, au lieu d'eliminer
quelque fluide hors du corps, en attirent: on les regarde
comme le commencement des veines lymphatiques, et on
les nomme pores inhalans, c'est par ces ouvertures que
peut s'introduire dans le corps et se mêler avec le sang l'air
l'humidité, des miasme et virus contagieux et même des
remèdes comme p.e. le mercure. Ces pores étant par leur
structure naturelle disposés à resorber les corps qui les
touchent, il est evident qu'ils doivent par la même raison
attirer et recevoir la partie la plus subtile des eaux de
l'amnios et la mener au sang, par ainsi contribuer à la
formation de ces pores et en même tems à la nutrition
du foetus

L'état naturel d'un foetus c'est d'avoir les lèvres
jointes l'une à l'autre, dans les premiers mois les eaux de
l'amnios passent entre deux en les tournant en dedans; mais
passé le mi-terme les parties commençant à exercer les
mouvements auxquels elles sont destinées, l'enfant a assez de
force pour serrer les lèvres et à ne les écarter et laisser
entrer dans la bouche autant de ces eaux qu'il sent avoir
besoin et que son estomac peut supporter. C'est par ce
mouvement des lèvres que l'enfant est accoutumé comme
machinalement dans le ventre de sa mere, qu'il est préparé

aussitôt en arrivant au monde à ouvrir la bouche et à
recevoir et tirer sa nourriture ^{de la mamelle} du sein qu'on lui présente
pour sucer.

On peut donc nommer ces eaux le premier fluide
de l'homme, dans lequel il nage, il est formé sur lequel il
est moulé, par lequel il est nourri et à l'aide duquel
il entre dans le monde.

Les bornes d'un mémoire ne m'ont pas permis
d'entrer en une plus grande discussion sur ce sujet.
J'ai cru que je n'en pourrais faire un meilleur usage
que de l'adresser à l'Académie Royale de Chirurgie,
qui m'a fait l'honneur de m'associer, esperant qu'elle
voudra bien agréer cet hommage comme une marque
de mon attachement et du désir que j'ai de mériter
son estime

à Etltnirch
le 2 Janvier
1771.

Pietsch
Doct. en Méd. Demonstr.
en Anat. et Chirurg. Corresp.
de l'Acad. Roy. de Chirurg.

